

DE NOMBREUSES MUTATIONS

De très nombreuses mutations de couleur sont apparues au fil des années.

Parmi les plus connues, on trouve la mutation bleu de mer apparue en Hollande vers 1963, la mutation lutino qui est liée au sexe.

On connaît aussi la mutation vert olive, vert foncé, panaché, etc.



DANS LA MEME FAMILLE



Inséparable masqué



Inséparable de Fischer




Inséparable Liliane

LES INSEPARABLES



Inséparable à Rosegorge ou Roseicollis.

Région Ornithologique Est France





L'inséparable à rosegorge ou Roseicollis est un oiseau robuste, et qui s'adapte parfaitement en cage ou en volière, à l'intérieur comme à l'extérieur, du moment qu'il possède un abri pour se protéger du froid. Il n'exige que peu d'entretien.

Les couples formés restent unis à vie .

LE LOGEMENT

LA CAGE:

La cage, rectangulaire, pour un couple doit avoir une dimension minimale de 40 cm de haut, 40 cm de large et 70 cm de long.

Toutefois, une petite volière est préférable, car le roseicollis aime voler et grignoter.

Garnir le fond de la cage de papier journal, un peu de sable anisé, avalé par les oiseaux, il aide à la digestion. Il convient de renouveler ce fond de cage une fois par semaine.

Offrir à vos oiseaux des jouets.

L'ENVIRONNEMENT:

Le Roseicollis n'aime pas la solitude, ni les odeurs de cuisine et de graisse. Il ne craint pas le froid, mais doit pouvoir s'en protéger, sous peine de gelures aux pattes.

LES SOINS

ALIMENTATION:

La nourriture de base de la perruche est constituée d'un mélange de graines grande perruche (graines de millet, d'alpiste, avec un peu de lin, d'avoine, de cardy, de panis).

En complément, des légumes ou fruits frais, coupés en petits morceaux, râpés ou entiers selon leurs habitudes: pissenlit, pomme, orange, brocoli, courgette, carotte, mouton à fleurs blanches (le mouton rouge ou bleu est toxique), épinard, graines de maïs cuites., etc.

Eviter la laitue, car elle peut provoquer des diarrhées.

LES SELS MINERAUX:

Les blocs de minéraux et les os de seiche fournissent le calcium et les autres minéraux indispensables à l'équilibre de l'alimentation.

FRIANDISES:

Les grappes de millet, quelques graines de tournesol sont des friandises très appréciées.

PATEES, BISCUITS ET AUTRES :

En période de reproduction, on distribuera de la pâtée aux œufs (biscottes et œufs durs écrasés), des graines germées. En dehors de cette période, pour éviter des problèmes de surpoids et de foie, ces compléments sont à éviter, car trop riches.

LA BOISSON ET LE BAIN:

L'eau de boisson doit être renouvelée tous les jours. De l'eau fraîche pour un bain matinal est très appréciée.

DIMORPHISME SEXUEL

Il n'y a pas de dimorphisme sexuel chez le Roseicollis. Par l'observation, on distingue toutefois les femelles lors de la construction du nid, car elles transportent les brindilles dans les plumes de leur croupion.

LA MUE

La mue est un phénomène naturel de renouvellement des plumes. Elle peut être déclenchée par une brusque différence de température (d'un lieu frais vers une pièce chauffée). Elle est source de fatigue.

LA REPRODUCTION

Les Roseicollis sont prêts à se reproduire au cours de leur deuxième année de vie.

Le fond du nid peut être garni de copeaux et on peut mettre à disposition des oiseaux des branches de saule, de millet, pour qu'ils construisent eux-mêmes l'intérieur de leur nid.

La femelle pond 5 à 6 œufs qu'elle couve durant 23 jours environ.

