

DIFFERENTES ESPECES



Colombe Diamant brillante



Colombe Masque de Fer



Colombe de Buckley

CAILLE




Caille de Chine

LES COLOMBES



Colombe Turvert

Région Ornithologique Est France





La famille des colombidés comporte de très nombreuses espèces qui peuvent, à raison d'un couple par espèce, cohabitées dans la même volière si elle est assez grande.

LE LOGEMENT

LA CAGE:

Une petite volière d'environ 80 X 40 X 40 est un minimum pour les petites colombes (tels que les colombes diamant ou la tourterelle domestique), pour les autres espèces, l'idéal est de les loger en volière 1m x 1m x 2m de haut.

L'ENVIRONNEMENT:

Les colombes n'aiment pas les courants d'air, ni les fortes chaleur sans un endroit frais où s'abriter. Les odeurs de cuisine, de graisses, ne sont pas appréciés.

Une fenêtre ouverte, un soleil direct l'été, ne sont pas des endroits fréquentables pour elles, par contre, elles peuvent passer l'hiver dans un local non chauffé, hors gel.

LES SOINS

ALIMENTATION:

La nourriture des colombes est un mélange de graines pour tourterelles, mélange de cardy, de chanvre, paddy, riz, colza, millet, tournesol, avoine pelé, orge, mais concassé. La colombe apprécie aussi les fruits et les vers de farine.

LES SELS MINERAUX:

Le sable anisé sur le sol est indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme de la colombe. L'os de seiche peut aussi lui être présenté.

FRIANDISES:

Les grappes de millet, quelques graines de tournesol sont des friandises très appréciées.

PATEES, BISCUITS ET AUTRES :

En période de reproduction, on distribuera de la pâtée aux œufs (biscottes et œufs durs écrasés), des graines germées. On peut également leur donner de la pâtée du commerce avec un mélange d'insectes. En dehors de cette période, pour éviter des problèmes de surpoids et de foie, ces compléments sont à éviter, car trop riches.

LA BOISSON ET LE BAIN:

L'eau de boisson doit être renouvelée tous les jours. De l'eau fraîche pour un bain matinal est très appréciée.

DIMORPHISME SEXUEL

Le dimorphisme sexuel différent selon les espèces (cerle oculaire, couleur plus vive chez le mâle,

LA MUE

La mue est un phénomène naturel de renouvellement des plumes. Elle peut être déclenchée par une brusque différence de température (d'un lieu frais vers une pièce chauffée). Elle est source de fatigue.

LA REPRODUCTION

La femelle construit un nid fait de brindilles, si on la laisse faire (nid très fragile). Il vaut mieux lui proposer un nid en osier un peu plus grand que celui d'un canari.

Elle pond 2 œufs à un jour d'intervalle qui seront couvés pendant 14 à 16 jours. Les petits grandissent très rapidement, sortent du nid une quinzaine de jours après leur naissance et sevrés après 6 à 8 semaines.

Les parents les nourrissent avec le « lait de jabot ».

