

DE NOMBREUSES MUTATIONS

La *perruche ondulée* est originaire d'Australie. L'oiseau de couleur sauvage est vert clair avec une tête jaune. Importé en Europe en 1840, les différentes couleurs sont apparues au début des années 1900.

La *perruche anglaise* connaît aujourd'hui un engouement mondial et se décline maintenant en de nombreuses mutations.



On distingue 2 groupes: la perruche ondulée, de couleur et la perruche ondulée de posture ou perruche « anglaise » qui, elle, se caractérise par sa grande taille et sa posture.



SEMBLABLES

La *perruche calopsite* exige une volière au vu de sa grande taille. Facile à apprivoiser, c'est un oiseau peu bruyant, sociable, très affectueux et peu destructeur.




La *perruche Catherine* appelée aussi *Toui Catherine* est voisine des perruches.

Calme, elle préfère grimper que voler. La patience est de mise pour l'apprivoiser.



La *perruche moineau* ou *Toui céleste* est plus petite, peu bruyante. Elle peut parfois pincer fortement, mais aussi être très douce.

LA PERRUCHE ONDULÉE



Région Ornithologique Est France





La perruche ondulée est un oiseau assez facile à élever. Elle peut vivre de 5 à 15 ans.

En cage individuelle ou en volière, elle aime jouer et peut être apprivoisée avec un peu de patience. Elle a besoin d'espace pour voler.

Parfois agressive envers les autres espèces, elle aime vivre en colonie ou au moins en couple.

Apprivoisée, les fenêtres fermées, elle peut rester libre dans la pièce.

LE LOGEMENT

LA CAGE:

La cage, rectangulaire, pour un couple doit avoir une dimension minimale de 40 cm de haut, 40 cm de large et 70 cm de long.

Garnir le fond de la cage de papier journal, un peu de sable anisé, avalé par les oiseaux, il aide à la digestion. Il convient de renouveler ce fond de cage une fois par semaine.

Offrir à vos oiseaux des jouets.

L'ENVIRONNEMENT:

Les perruches, n'aiment pas les courants d'air, ni les fortes chaleurs sans un endroit frais où s'abriter. Les odeurs de cuisine, de graisses, ne sont pas appréciées.

Une fenêtre ouverte, un soleil direct l'été, ne sont pas des endroits fréquentables pour eux, par contre, elles peuvent passer l'hiver dans un local non chauffé, hors gel.

LES SOINS

ALIMENTATION:

La nourriture de base de la perruche est constituée d'un mélange de graines perruches ondulées (graines de millet, d'alpiste, avec un peu de lin, d'avoine, de cardy, de panis).

En complément, des légumes ou fruits frais, coupés en petits morceaux, râpés ou entiers selon leurs habitudes: pissenlit, pomme, orange, brocoli, courgette, carotte, mouron à fleurs blanches (le mouron rouge ou bleu est toxique), épinard, graines de maïs cuites., etc.

Eviter la laitue, car elle peut provoquer des diarrhées.

LES SELS MINERAUX:

Les blocs de minéraux et les os de seiche fournissent le calcium et les autres minéraux indispensables à l'équilibre de l'alimentation.

FRIANDISES:

Les grappes de millet, quelques graines de tournesol sont des friandises très appréciées.

PATEES, BISCUITS ET AUTRES :

En période de reproduction, on distribuera de la pâtée aux œufs (biscottes et œufs durs écrasés), des graines germées. En dehors de cette période, pour éviter des problèmes de surpoids et de foie, ces compléments sont à éviter, car trop riches.

LA BOISSON ET LE BAIN:

L'eau de boisson doit être renouvelée tous les jours. De l'eau fraîche pour un bain matinal est très appréciée.

DIMORPHISME SEXUEL

On différencie le mâle de la femelle à la **cire** (peau qui est au-dessus du bec et où s'ouvrent les narines).

La cire est bleue chez le mâle, brune chez la femelle. Lorsque les oiseaux sont prêts à se reproduire, cette différence est plus intense et prononcée.

LA MUE

La mue est un phénomène naturel de renouvellement des plumes. Elle peut être déclenchée par une brusque différence de température (d'un lieu frais vers une pièce chauffée). Elle est source de fatigue.

LA REPRODUCTION

Les perruches ondulées sont prêtes à se reproduire à l'âge d'un an. Elles nichent dans des nichoirs fermés (horizontal de préférence avec une petite cuvette pour les œufs). La femelle pond 4 à 8 œufs, à même le bois, à 2 jours d'intervalle et elle les couvent pendant 18 jours, souvent à partir du 2^{ème} œuf. Les poussins restent au nid durant 22 à 26 jours et débutent le sevrage vers l'âge d'un mois.

